

**Tema:**

## **IVERMECTINA**

**Fechas: 3 – 6 octubre 2011**

---

Hola,

Yo tengo una consultilla sobre la Ivermectina (Ivomec). Por lo visto se diluye en Propilenglicol para la inyección subcutánea en animales pequeños. Pero hay varias referencias en el mercado y no sé cual es la correcta. O quizá tengáis otro protocolo para diluirla!

Muchas gracias

Alicia

---

Alicia,

Hay otras marcas en el mercado (Suictine®) que no van disueltas en propilenglicol, sino con alcohol bencílico. Puedes diluirlo con el mismo excipiente ya que la dosis final a administrar es muy baja y no irritará... Incluso diluyéndolo con salino sigue siendo efectivo y también vía oral pero con un tratamiento más largo...

Laura

---

Hola Alicia disculpa el retraso de la respuesta.

Para no estar disolviendo la Ivermectina, yo utilizo una Ivermectina al 0.08 % de uso en ovejas vía oral (NOROMECTIN DRENCH). Se pulveriza sobre los ratones dos veces con un intervalo de 21 días, hay que cambiar y autoclavar todo.

Clara

---

Hola Clara, la pulverización imagino que es para conseguir una absorción vía tópica. ¿Te ha funcionado ?. Yo la he dado en agua de bebida pero esta vía me parece mucho mas cómoda.

Enrique

---

Hola a tod@s,

La ivermectina tiene graves efectos secundarios sobre todo en ratones consanguíneos o con alguna inmunodeficiencia o modificados genéticamente. Hace tiempo que tuvimos este debate en SECAL-L y se mencionaron los otros productos alternativos para dependiendo del

uso para erradicar endoparásitos o ectoparásitos. Hay varias publicaciones sobre los efectos colaterales de la ivermectina, incluso para el medio ambiente.

Un cordial saludo

Juan

---

SECCALIL